Fruchtbarkeit bei Milchkühen

Dr. Johann Gasteiner
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Inhaltsübersicht

- Einleitung
- Kennzahlen zur Fruchtbarkeit
- Faktoren, welche die Fruchtbarkeit beeinflussen
 - Management und Haltung
 - Fütterung
 - Genetik
 - Hygiene
 - Erkrankungen (Stoffwechsel, Klauen, ...)

- Konkrete Fruchtbarkeitsprobleme
 - Brunstlosigkeit/stille Brunst
 - Unter- / Überfunktion der Eierstöcke
 - Umrindern
 - Gebärmutterentzündungen
 - Abortursachen
- Möglichkeiten zur Verbesserung der Fruchtbarkeit (Tierarzt)
 - Hormonelles Reproduktionsmanagement
 - Trächtigkeitskontrolle
 - Puerperalkontrolle
- Zusammenfassung

Einflüsse auf die Fruchtbarkeit

Kennzahlen zur Fruchtbarkeit

- **Rastzeit:** Zeit von Abkalbung bis erster Besamung: 45 - 65 Tage
- **Brunstauftritt bis 60. Tag p.p.:** Anteil der Kühe, die nach dem Abkalben bis zum 60. Tag selbständig in Brunst kamen: über 85 %
- **Güstzeit/Zwischentragezeit:** Zeit zwischen Abkalben und erfolgreicher Belegung: unter 85 Tage
- **Besamungsindex (BI):** Anzahl erforderlicher Besamungen pro Trächtigkeit: unter 1,6
- **Trächtigkeitsrate nach Erstbesamung:** über 60 %
- **Non Return Rate 60 (NRR 90):** Anzahl der Kühe, welche nach 60 Tagen nicht nachbesamt wurden (Abgänge eingerechnet): über 65%
- **Zwischenkalbezeit (ZKZ):** Anzahl Tage zwischen 2 Abkalbungen: 365 - 390 Tage
- **Merzungen nach Sterilität:** Abgänge auf Grund von Fruchtbarkeitsstörungen: unter 15 %
- **Abortraten:** Anteil der Trächtigkeiten über 6 Wochen, welche vorzeitig abgehen: unter 4 %

Brunstbeobachtung visuell

Dauer der Duldungsbereitschaft:

Früher: 18 Stunden

Aktuell: 7 Stunden

bzw.

14 % weniger 4 Stunden

26 % 4 - 8 Stunden

31 % 8 - 12 Stunden

20 % 12 – 16 Stunden

7 % 16 – 20 Stunden

2 % länger als 20 Stunden

Brunsterkennung visuell

Brunsterkennungsmethode	Anteil richtig erkannter Brunsten %
Permanente Beobachtung der Kuh	89 – 100
3 x täglich Brunstbeobachtung	74 – 85
2 x täglich Brunstbeobachtung (früh/spät)	60 – 80
Brunstbeobachtung während des Melkens	50
Gelegentliche Brunstbeobachtung	43

Becker, Kanitz und Heuwieser (2005), Zieger (2004)

Faktoren, welche die Fruchtbarkeit beeinflussen

MANAGEMENT

Brunstbeobachtung

- wenigstens 2 x außerhalb der Stallzeit
- Auslauf
- Hilfsmittel: Progesterontest, Farbpatronen, Pedometer, Brunstkalender, elektronisch

Vermeidung von Schmerzen und Stress

Stallung

- bestmöglicher Kuhkomfort
- Licht, Luft, Bewegungsfreiheit; Hitze!
- Rutschsicherheit (Brunstverhalten!!)

Umweltbedingungen und Fruchtbarkeit

„Nur Kühe in einer entsprechend günstig gestalteten Umwelt bringen gute Fruchtbarkeitsergebnisse“

➔ Kuhkomfort

- Luft und Stallklima, Lichtverhältnisse
- Fressplatzgestaltung, -management und Wasserversorgung
- Liegebereich, Laufgänge, Bodengestaltung, ..
- 85 % der Fruchtbarkeitsleistung werden von „äußeren Produktionsbedingungen“ vorgegeben

➔ bei optimaler Gestaltung der Umwelt
= maximale Ausschöpfung des Fruchtbarkeitspotentials

Licht: gesetzliche Bestimmungen (Ö)

- Flächen, durch die Tageslicht fällt (Fenster) betragen mind. 3 % der Stallbodenfläche

oder

Die Tiere haben ständig Zugang ins Freie

Licht: gesetzliche Bestimmungen (Ö)

- Der Tierbereich des Stalles weist über mind. 8 Stunden/Tag wenigstens 40 Lux auf

➔ Lichtmangel dämpft das Fruchtbarkeitsgeschehen

**verschmutzte
Leuchtstoffröhre**

**verschmutzte
Fenster**

Lichtprogramme auch im Milchviehstall?

Lichtprogramm Geflügel:

➔ Erhöhung der Legeleistung, Standard

Lichtprogramm Zuchtsauen:

zur Stimulation der Rausche

➔ Deutliche Erhöhung der Fruchtbarkeit

Lichtprogramm Milchkühe:

USA Standard in Großbetrieben

- Erhöhung der Milchleistung um 5 - 10 %
- Stimulation des Hormonstoffwechsels
- ++ Einflüsse auf Fruchtbarkeit

Lichtprogramme auch im Milchviehstall?

Lichtprogramm Milchkühe (USA):

- **16 - 18 h Lichtphase** (mind. 220 Lux)
- **6 - 8 h Dunkelphase**
(schwache roteleuchtende Notlampen 10 Watt)
- **Steuerung über Zeitschalter und Photozelle**
- **Alternative: heller Stall und Auslauf bzw. Weide!!!**

**Bei uns Probleme vorrangig im
Winter**

Temperatur – Anforderungen von Milchkühen

Kühe sehr kälteresistent, jedoch wenig hitzeresistent

- am kältesten Tag des Jahres 4 kg Milch/Kuh mehr als am heißesten Tag des Jahres
- Hitzestress beginnt ab 25 °C Umgebungstemperatur

- bei Hitze Luftraten erhöhen (2 m/s)
Ventilatoren

- evtl. Sprenkler

Dr. Johann Gasteiner
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Dr. Johann Gasteiner
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Dr. Johann Gasteiner
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Fütterung

Ziel:

Verhinderung der 3 wichtigsten Stoffwechselkrankheiten

- **Ketose (Verfettung und Energiemangel)**
- **Milchfieber**
- **Pansenübersäuerung**

Nur, wer diese Stoffwechselerkrankungen im Griff hat, der kann auch gute Fruchtbarkeitsergebnisse haben

Definition Azetonämie

(Ketose, Azetonurie, Ketonämie, Ketonurie)

**Störung des Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsels
(2. - 6. Laktationswoche)**

- **Absinken des Blutzucker-Spiegels**
- **massiver Abbau von Körperfett („Abmelken“)**
- **Anstieg freier Fettsäuren im Blut**
- **Anstieg der Ketonkörperkonzentration im Blut ▪
Harn, Milch, Atemluft**

Ketonkörperproduktion

Milchleistung - TM-Aufnahme

Sekundäre Ketose

„Grundkrankheiten“ → Störung der Futteraufnahme

- **Schwergeburten**
- **Gebärparese**
- **akute Euterentzündung**
- **Labmagenverlagerung**
- **Fremdkörpererkrankung**
- **Klauen- und Gliedmaßenenerkrankungen**
- **Verdauungsstörungen, insbesondere die Pansenübersäuerung**

Fettleber

Dr. Johann Gasteiner
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Leber histologisch gesund

Leber histologisch verfettet

Folgen der Ketose

- **Abmagerung, Minderleistung, gestörte FA**
- **erhöhte Infektanfälligkeit**
(Gebärmutter- und Euterinfektionen)
- **erhöhte Harnstoffwerte Milch**
- **Fruchtbarkeitsstörungen**

Stillbrünstigkeit

Ovarialzysten

Gebärmutterentzündung

Trächtigkeitsrate ↓

Nachweis der Ketose

- **Vorbericht und Klinik sowie zu starkes Abmageren**
- **Ketonkörpernachweis:
Blut, Harn, Milch, Atemluft**
- **Blutparameter
Glukose, TBIL, AST, GLDH, BHBS,
Triglyzeride, evtl. Cholesterin, GGS**
- **Leberbiopsie (Schwimmprobe, Histologie)**
- **MLP-Daten (F↑, E↓, F/E-Q↑, Milchmenge↓)**

Anzustrebende Körperkondition

Vorbeugemaßnahmen

- **Optimierung von Fütterung, Haltung, Stallung, Klima**
- **kontinuierliche Steigerung der KF-Gaben (max. 0,3 kg/Tag)**
- **Gezielte Überwachung von Milchleistungsmerkmalen**
- **routinemäßiger Einsatz von Schnelltests**
- **Bewegung und frische Luft**

Milchfieber (Gebärparese)

- hauptsächlich 12 - 36 h nach Abkalbung
- bei 5 - 20 % aller Abkalbungen (Ø 9 %)
- akuter Mineralstoffmangel (Ca, P, Mg)

Auslöser:

- hohe Mineralstoffabgaben über Milch,
in 10 l Milch: 12 g Ca, 10 g P, 1 g Mg
- Absinken des Gehaltes im Blut
- Mangel in Muskulatur
- Festliegen

Zeitlicher Verlauf des Ca-Gehaltes im Blut um den Abkalbzeitpunkt

Krankheitserscheinungen

akuter Ca-Mangel (Hypokalzämie)

- Absinken der inneren Körpertemperatur!
- plötzliches Schwanken/Umstürzen
- Benommenheit, Schläfrigkeit
- Ausfall von Sensorium und Sensibilität
- Speichelfluss, fester Kot
- Herz- Pansentätigkeit ↓
Pansenblähung
- Leistungsrückgang, Behandlungskosten
- Folgeerkrankungen (Fruchtbarkeit, Verdauung,
➤ LMV, Fundament)

Krankheitserscheinungen

akuter P-Mangel (Hypophosphatämie)

- **Festliegen**
- **Fresslust und Aufmerksamkeit erhalten!**

akuter Mg-Mangel (Hypomagnesämie)

- **Festliegen + Krämpfigkeit**
- **Mischformen häufig**

Behandlung Milchfieber

Infusion Tierarzt

Hypokalzämie: rascher Erfolg

Hypophosphatämie: zögerlicher

Nachbehandlung mit oralen Phosphaten
nur bei erhaltenem Schluckreflex

Fessel anlegen

- tiefe Einstreue
- Festliegende alle 3 - 4 h wechseln

Blutuntersuchung durch Tierarzt
(Mineralstoffe, Muskelenzyme)

Möglichkeiten zur Vorbeuge der hypokalzämischen Gebärparese

- Verminderung der Ca-Versorgung in der Vorbereitungsfütterung (prakt. nicht immer möglich)
- vorbeugende Gaben von Ca-Salzen
Injektion von Vit D₃ um den Abkalbezeitpunkt
- Anionen-K...
(Dietary Ca... erung saurer Salze

Weitere Formen der Gebärparese

Hypophosphatämie

Hypomagnesämie

- **Fütterungsinduziert: absoluter Mangel in der Vorbereitungsfütterung**

- **Optimierung der Versorgung**
- **Empfehlungen der GfE (g/d):**
 - P > 22**
 - Mg > 16**
 - Ca < 40**
- **bei Verfütterung saurer Salze: > 150 g Ca/Tier/Tag**
(KAMPHUES 2000)

Pansenübersäuerung (Pansenazidose)

- **Pansenübersäuerung:** zu niedriger pH-Wert des Panseninhaltes
- **subklinisch (unerkannt) oder akut**
- **Pansensaftgewinnung per Schlundsonde**

pH 6,5 - 7,2 optimal

pH 6,2 - 7,5 Normbereich

pH 5,5 - 6,1 subklinische Azidose

pH < 5,5 klinische Azidose

Ursachen der Pansenazidose

- Aufnahme zu großer Mengen Kraftfutter (Stärke, Zucker)
- zu geringer Anteil an Rohfaser
- Kühe kauen weniger wieder
⇒ geringere **Speichenproduktion**
- ungenügend angepasste Pansenflora
- starke Schwankungen in der Futteraufnahme

Pansenazidose

Beispiel anhand einer Simulation

➤ Pansenaft + Milchsäure

➤ Auswirkungen auf PROTOZOEN

pH-sensibel

Große 1/3, vermehrt bei rohfaserreicher Fütterung

Mittlere 1/3

Kleine 1/3, vermehrt bei KF-betonter Fütterung

Pansenübersäuerung (Pansenazidose)

- Pansenübersäuerung: zu niedriger pH-Wert des Panseninhaltes, ...exakte Definition?
- subklinisch (bis 22% der Milchkühe) oder akut
- Pansensaftgewinnung beeinflusst Ergebnis

pH 6,5 - 7,2 optimal

pH 6,2 - 7,4 Normbereich

pH 5,5 - 6,1 subklinische Azidose...stimmt das?

pH < 5,5 klinische Azidose...stimmt das?

Dr. Johann Gasteiner
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Hinweise auf eine Pansenazidose

- Abfall Milchfettgehalt
- Rückgang Wiederkauaktivität und Futteraufnahme
- Rückgang Pansenaktivität (Bewegung und Geräusche)
- Durchfallkot mit Beimengungen von unverdauten Futterpartikeln
- Harn: NSBA: Sensitivität 52 %
Spezifität 59 %
Säuren-Basen-Quotient: ähnlich
- Blut: Laktat, GLDH, Ketonkörper: geringe Aussagekraft

➡ Hinweise auf bestehende Pansenazidose

➡ Keine Frühwarnsysteme sondern Fehlermeldungen!

Vorbeuge der Pansenübersäuerung

Grundvoraussetzung: stabiles Fütterungsmanagement

- ◆ Mindestanteil an Rohfaser (16 %)
- ◆ Maximalmenge Kraftfutter (50%)
- ◆ Pansenaggressive Futtermittel: Getreide, energiereiche Mehle und Schrote, Melasse, Obst und Pressrückstände, junges Weidegras, Trocknungsheu
- ◆ Pansenbakterien benötigen Zeit zur Anpassung
 - ➔ Rationsumstellungen langsam vornehmen (ca. 10-14 Tage)
- ◆ Pansenpuffer: Bikarbonat; **Futterhefen**
- ◆ Kühe alle 3 Stunden zur Futteraufnahme
 - ◆ Frisches Futter bzw. Nachschieben

Hygiene

- **Umwelt des Tieres**
 - Haltungsbedingungen, Einstreu
- **Futterhygiene**
 - verschmutzt, verpilzt,
bakt. belastet, → verdorben
- **Geburtshygiene**
 - Reinigung/Desinfektion
 - eigener Abkalbebereich

Nacherwärmung Silage

Objektparameter	Wert
Atmosphärentemperatur	20.0 °C
Bezeichnung	Wert
sp1: Temperatur	21.5 °C
ar1: Max. Temperatur	31.8 °C
ar1: Min. Temperatur	22.6 °C
ar1: Durchschnittstemperatur	26.0 °C

Dr. Johann Gasteiner
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

ZON (Zearalenon)

- Östrogene Eigenschaften (Scheinbrunst)
 - Schwellung der weiblichen Geschlechtsorgane
- Fruchtbarkeitsstörungen
- Aborte
- Entzündungen

DON ist Marker für Mykotoxine
< 100 µg/kg = Richtwert

Listeriose bei Rindern

Formen der Listeriose

- **ZNS – Forum (eitrige Hirnhautentzündung)**
 - **Trächtigkeitlisteriose mit Abort**
 - **Organlisteriose (Gesäuge)**
 - **Erkrankungen verlaufen akut (ZNS-Form)**
 - **Behandlung aufwendig, Prognose schlecht**
- **Nachweis: Einsenden an Untersuchungsanstalt**

Neosporose

Neospora = Einzeller im Darm des Hundes (Fuchs?)

Aborthäufigkeit beim Rind in Ö ca. 5 %

ca. 1/3 davon durch Neospora

- mögliche Infektion auf der Weide oder Futtertisch (Hofhund)
- horizontale Verbreitung (Geburtshygiene)
- vertikale Verbreitung (von Kuh zu Kalb)
- Einschleppung durch infizierte Zukauftiere
- Infektion bleibt auch ohne Hund im Bestand

Optimaler Ablauf der Geburt

- **am Stand:** unter hygienischen Verhältnissen
- **bei Laufstallhaltung** → **separate Abkalbebox**
 - unter hygienischen Verhältnissen
- **nach Möglichkeit unter Aufsicht**
- **bei Zughilfe:** warmes Wasser, Seife, Desinfektionsmittel
 - Reinigung von Instrumenten, Schamgegend, Hände - Arme
 - Kontrolle von Geburtsweg und Position des Kalbes
 - mechanische Geburtshilfegeräte?
 - Anlegen der Geburtsstricke hinter den Fesselgelenken
 - Dammschutz und kontrollierter Auszug
 - Nabelschutz während Auszug

Dr. Johann Gasteiner
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Dr. Johann Gasteiner
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Dr. Johann Gasteiner
HBLFA Raumberg-Gumpenstein

Abkalbung

Ziel ist die Vermeidung von Schweregeburten

- **Abkalbung** – Ziel ist die Vermeidung von Schweregeburten
- **Anpaarung:** Wahl eines geeigneten Stieres
- **Erstkalbealter:** nicht unter 26 Monate
- **Verfettung trockenstehender Kühe vermeiden**

Abkalbung

Verfettete Kühe 4 x häufiger Schwergeburt - Probleme für Kuh und Kalb:

Kuh:

- Stress
- Geburtsverletzungen
- Nachgeburtsverhalten
- Gebärmutterentzündungen
- Fruchtbarkeitsstörungen

Klauengesundheit

- **Stark abhängig von Klauenpflege**
 - ➔ **mind. 2 x jährlich Klauenschneiden**

Lahme Kühe: Schmerzen, Stress, schlechte Fruchtbarkeit

Kühe mit Schmerzen nehmen nicht auf

Zyklusstörungen

- „Brunstlosigkeit“ oder „stille Brunst“
(Brunstbeobachtung!)

Ursachen:

- Unterfunktion der Eierstöcke
- Gelbkörperzysten
- Unregelmäßige Zyklen
- Energiemangel und hohe
Milchharnstoffwerte

Umrindern

- **Trotz Brunst + Besamung keine erfolgreiche Trächtigkeit**

Ursachen:

- **Infektionen (Gebärmutter, Allgemeininfektion wie BVD)**
- **Besamungsfehler (Zeitpunkt,..)**
- **Zystenbildung**
- **frühembryonaler Tod (ca. 25%)**

Nachgeburtsverhalten

Nachgeburt geht nicht innerhalb von 12h ab → Abnahme durch Tierarzt, AB 2 x PG nach 14 Tagen

Folgen:

- akute / chronische Infektion (Schmerzen, Fieber)
- streuende Herde (Gelbfieber)
- Sinkende Fruchtbarkeit

Möglichkeiten zur Verbesserung der Fruchtbarkeit

- Optimierte Fütterung (altemelkend und trockenstehend!!!)
- Kontrolle der LKV-Daten
- Futtermittel-Untersuchung, Rationsberechnungen
- Kontrolle Stoffwechselsituation Kühe
BCS oder Rückenfettdicke, Ketontest, LKV-Daten
- Mineralstoff-, Vitamin-, Spurenelementversorgung optimieren (auch Kalbinnen!)
- erhöhte Versorgung mit Vit. A / β -Carotin
- → ab 3 Wochen vor Abkalbung 300-500 mg/Kuh/Tag
- wie lange? → bis erfolgreiche Trächtigkeit
- Auslauf, rutschsicherer Boden
- Licht, Luft, Bewegung

Tierärztliche Bestandsbetreuung

2 – 3 Wochen p.p.

gynäkolog. Untersuchung

4 – 6 Wochen p.p.

**gynäkolog. Untersuchung
Milchinhaltstoffe, evtl. Blut (Leber,
Harnstoff, β -Carotin, Ketonkörper)**

6 – 10 Wochen p.p.

**Untersuchung/Behandlung nicht
besamter Tiere**

**5 – 8 Wochen
nach Besamung**

Trächtigkeitsuntersuchung

- **Aufvitaminisieren**
- **Hormonelle Zyklussteuerung**
- **Prostaglandin, GnRH-Injektion**
- **Progesteron-Pillen, Spirale**
- **„Stierpulver“**

Zusammenfassung

**Feststellung des Fruchtbarkeitsstatus´ der Herde
(Kennzahlen)**

Einflussfaktoren

Management Genetik Fütterung Hygiene Haltung

- Optimale Körperkondition beim Abkalben**
- Maximale Futteraufnahme nach dem Abkalben**
- Wiederkäuergerechte Ration**
- Proteinüber-, -unterversorgung vermeiden**
- Ausgewogene Mineralstoff-Vitaminversorgung**

Trockenstehzeit-Start Laktation

Fütterungsphasen

Trockenstellen

Regenerationsphase

4-6 Wochen

“Far off”

Abkalbung

**Transit-
oder
Anfütterungs-
Phase**

2-3 Wochen

“Close up”

**Frisch-
Laktierend**

3 Wochen

“fresh”

Trockenstehzeit: zeitliche und räumliche Trennung !!!

Dr. Johann Gasteiner
HBLFA Raumberg-Gumpenstein